

Коричнево-мраморный клоп

Коричнево-мраморный клоп (*Halyomorpha halys* Stal) – карантинный объект, включенный в Единый перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Евразийского экономического союза.

Способы переноса и распространения:

- перелеты в поисках растений-хозяев, полового партнера, мест откладки яиц;
- с транспортными средствами и сельскохозяйственной техникой;
- с растениями (саженцами), растительной продукцией;
- с тарой и упаковочным материалом.

Повреждаемые растения:

Коричнево мраморный клоп – полифаг, в местах природного обитания питается 300 видами растений: повреждает плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, бобовые (фасоль, соя) и злаковые культуры (кукуруза) и др.

Симптомы повреждений:

Появление падалицы, характерные проколы листьев и плодов с образованием некротических зон: на яблоне и груше образуется некроз, опробкование, под кожицей – сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде – ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах – в местах прокола развивается гниль плодов.

Вредоносность:

Распространение коричнево-мраморного клопа существенно влияет на объем и качество урожая. Так в Абхазии в 2017 году карантинный объект уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука. Вред, причиняемый карантинным объектом, особенно заметен на плодовых и овощных культурах.

В странах Европы и США коричнево-мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Виноградари и виноделы обеспокоены появлением клопа в Европе, так как он не только повреждает ягоды, но и может оказывать влияние на качество вина.

Против коричнево-мраморного клопа единственным эффективным способом борьбы является – химический, пестицидами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

В помещениях необходимо собирать насекомых механическим путем.

